

A photograph of a woman and a young child lying on their stomachs on a grassy field. The woman is on the right, smiling broadly with her eyes closed. The child is on the left, laughing with their mouth open and hands clasped near their face. The scene is bathed in warm, golden light, suggesting late afternoon or early morning.

KANTAR

Postawy wobec szczepień przeciwko rotawirusom

KANTAR Polska

O projekcie

Główne cele badania

POZIOM ŚWIADOMOŚCI

- Jaki jest poziom świadomości **zagrożenia rotawirusami**?
- Czy są znane **objawy**?
- Jaki jest poziom **znajomości szczepień ogółem i szczepień przeciw rotawirusom**?
- Jakie są **źródła informacji o szczepieniach**?
- Czy odbywane są **rozmowy z lekarzem rodzinnym / pediatrą** na temat szczepień przeciwko rotawirusom?

DOŚWIADCZENIA

- Czy **występują w rodzinie choroby** wywołane przez rotawirusy?
- Jakimi były **objawy wystąpienia, zachowania rodziców**, następane kroki po identyfikacji zakażenia?
- Na ile wystąpienie choroby rotawirusowej jest uciążliwe dla rodziny?
- Czy dzieci **były szczepione przeciwko rotawirusom**, jeśli nie, to jaki jest poziom rozważanie tego szczepienia?

OPINIE

- Jaki jest poziom **otwartości / zamknięcia na szczepienie** dzieci?
- Jaka jest **postawa wobec szczepień przeciwko rotawirusom**?
- Jakimi są **motywatory i bariery** wobec szczepień przeciwko rotawirusom?
- Jaka jest **rola ceny** w rozważaniu szczepienia, szczepieniu przeciwko rotawirusom?
- Jaka jest **opinia na temat włączenia szczepień przeciwko rotawirusom do Programu Szczepień Obowiązkowych**? Jak ta opinia różni się w zależności od doświadczeń, opinii i demografii?

Jak zrealizowano projekt?

BADANIE **JAKOŚCIOWE**

Bulletin Board Discussion: 3-dniowa społeczność internetowa

18 kobiet w przedziale wiekowym 18-45:

- Matki dzieci **od 6 tygodnia życia do 5 lat**, mix udział grup wiekowych dzieci
- **Decydentki / współ-decydentki** na temat zdrowia i leczenia swojego dziecka
- **Matki otwarte na szczepienia dziecięce** – dokonały co najmniej szczepień obowiązkowych
- **Matki świadome zagrożeń** jakie niesie ze sobą rotawirus (na poziomie deklaratywnym)
- Zróżnicowany udział mam **pierwszego i kolejnego dziecka**
- 50/50: **nie szczepiło / szczepiło** dzieci przeciw rotawirusom
- Badanie zrealizowano w dniach: **10-12.04.2019**



BADANIE **ILOŚCIOWE**


Badanie on-line Internetowy wywiad w matkami

Kryteria doboru do badania: posiadanie dzieci w wieku 6 tygodni – 5 lat oraz decydowanie o szczepieniach dzieci.

Finalnie w badaniu uzyskano N=500 wywiadów z reprezentatywną grupą **matek** dzieci w wieku 6 tygodni – 5 lat, które same bądź z ojcem dziecka podejmują decyzję o szczepieniach.

- Próba reprezentatywna ze względu na wiek, wielkość miejscowości i wykształcenie matek wg danych GUS
- Badanie realizowane drogą wywiadów internetowych
- Badanie zrealizowano w dniach: **29.04-15.05.2019**


Liczba urodzeń żywych w Polsce



Źródło: GUS


Dane demograficzne badanej próby matek

WYKSZTAŁCENIE




Struktura próby zgodna z rozkładem zmiennej w populacji wg danych GUS

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI




Struktura próby zgodna z rozkładem zmiennej w populacji wg danych GUS

WIEK




Struktura próby zgodna z rozkładem zmiennej w populacji wg danych GUS


MIESIĘCZNE DOCHODY NETTO W GOSP. DOMOWYM




WLK. GOSPODARSTWA DOMOWEGO



LICZBA DZIECI



WIEK DZIECI



Główne wyniki badania

Postawy wobec szczepień ogółem

Zdecydowana większość mam wykonuje u dzieci wszystkie szczepienia obowiązkowe i zalecane (60%). Przeciwników szczepień jest bardzo niewiele (2%).

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ


Jaki jest Pani osobisty stosunek do szczepień dzieci?

Wykonuję wszystkie szczepienia obowiązkowe i zalecane u mojego dziecka / dzieci.

Wykonuję głównie obowiązkowe szczepienia mojego dziecka / dzieci. Po szczepienia zalecane sięgam sporadycznie lub wcale, w miarę możliwości finansowych.

Wykonuję jedynie szczepienia obowiązkowe mojego dziecka / dzieci.


Jestem przeciwna szczepieniom, więc nie szczepię swoich dzieci i w przyszłości również nie zamierzam szczepić.



Najczęstszym motywatorem szczepień jest obawa przed zachorowaniem oraz chęć ochrony dziecka przed chorobami.


MOTYWATORY SZCZEPIEŃ

Wskazała Pani, że szczepi swoje dziecko szczepieniami obowiązkowymi i/lub zalecanymi. Dlaczego w ogóle decyduje się Pani na szczepienie swoich dzieci? Proszę wskazać wszystkie pasujące motywacje. [więcej niż 1 wskazanie]



N=489 Podstawa procentowania: matki, które wykonują szczepienia obowiązkowe i/lub zalecane

A który z tych powodów jest dla Pani najważniejszy? [1 wskazanie]
Pokazano odpowiedzi powyżej 5%



Rotawirusy: zachorowania i postawy wobec szczepienia



Z DOŚWIADCZEŃ MAM WYNIKA, ŻE ROTAWIRUS:

1. Jest najczęściej przynoszony z przedszkola / żłobka
2. Łatwo się nim zarazić (także na linii dziecko – dorosły)
3. Jego objawy dokuczają przez kilkanaście godzin, czasem też kilka dni
4. W niewielu przypadkach można się obejść bez konieczności konsultacji lekarskiej (mała uciążliwość i intensywność objawów chorobowych)
5. Biegunka rotawirusowa może prowadzić do odwodnienia dziecka i konieczności hospitalizacji
6. Ponad połowa mam obawia się konsekwencji zakażenia rotawirusem


Źródło: badanie jakościowe

Choroby spowodowane przez rotawirusy są znane i wywołują obawy. Niemal wszystkie matki słyszały o chorobach powodowanych przez rotawirusy i wiedzą jakie objawy im towarzyszą. Ponad połowa się ich obawia (52%).

CHOROBY SPOWODOWANE PRZEZ ROTAWIRUSY...

ZNAJOMOŚĆ

Czy słyszała Pani o chorobach powodowanych przez rotawirusy?



Ogółem, N=500

ZNAJOMOŚĆ OBJAWÓW


Jakie są Pani zdaniem objawy zakażenia rotawirusami?



Ogółem, N=500

OBAWA

W jakim stopniu obawia się Pani chorób spowodowanych zakażeniem rotawirusem?



Ogółem, N=500

Większość dzieci nie przechodziła zakażenia rotawirusem. Te dzieci, które się z tym zetknęły miały zwykle wszystkie objawy a ponad połowa matek uważa zakażenie za uciążliwe głównie z powodu dolegliwości dziecka.


OBJAWY CHOROBY

Jakie były objawy zakażenia rotawirusem, które wystąpiły w przypadku Pani dziecka?



UCIĄŻLIWOŚĆ CHOROBY

Jak określiłaby Pani uciążliwość zakażenia rotawirusem u Pani dziecka dla Pani i domowników?



POWODY UCIĄŻLIWOŚCI CHOROBY

Na czym polegała największa uciążliwość takiego zakażenia dla Pani jako matki? [pytanie otwarte]

Pokazano odpowiedzi powyżej 10%




Podstawa: matki, które zadeklarowały wystąpienie choroby spowodowanej zakażeniem rotawirusem któregośkolwiek ze swoich dzieci

Większość rodziców korzystała z konsultacji lekarskich w przypadku swoich dzieci. Ok 9-11% dzieci w wieku 6 tygodni – 5 lat, według deklaracji matek, trafiło do szpitala z powodu zakażenia rotawirusem.


KONSULTACJA Z LEKARZEM

Czy z powodu zakażenia rotawirusowego dziecka korzystaliście Państwo z porady lekarskiej?



HOSPITALIZACJA DZIECKA

Czy z powodu zakażenia rotawirusowego dziecko przebywało w szpitalu?



Podstawa: matki, które zadeklarowały wystąpienie choroby spowodowanej zakażeniem rotawirusem któregośkolwiek ze swoich dzieci

Prawie połowa matek deklaruje, że tylko one były na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby dziecka. Jednak niezależnie od płci rodzica zwolnienie trwało średnio 9 dni.

ZWOLNIENIE LEKARSKIE Z POWODU CHOROBY DZIECKA

Czy któreś z rodziców przebywało na zwolnieniu lekarskim wynikającym z konieczności opieki nad dzieckiem w trakcie przechodzenia zakażenia rotawirusem? Jak długo trwało to zwolnienie?


TAK, tylko ja byłam na zwolnieniu lekarskim

TAK, tylko ojciec dziecka był na takim zwolnieniu

TAK, zarówno ja, jak i ojciec dziecka byliśmy na takim zwolnieniu po kolei

NIE, ale ktoś inny opiekował się chorym dzieckiem

NIE było takiej potrzeby – ja albo ojciec dziecka nie pracujemy i możemy zostać w domu



Średnio: 7,79 dni
Mediana: 7 dni
Min.: 2 dni
Max: 21 dni
N=80



Średnio: 5,17 dni
Mediana: 5 dni
Min.: 1 dzień
Max: 15 dni
N=23

Relatywnie dłuższe zwolnienia biorą marki z niższym wykształceniem i matki pierwszego dziecka.

W przeliczeniu na liczbę dzieci, w wieku 6 tyg-5 lat, których przynajmniej jedno z rodziców brało zwolnienie lekarskie z powodu choroby rotawirusowej [wynik dla obojga rodziców].



Średnio: 8,59 dni
Mediana: 7 dni
Min: 2 dzień
Max: 27 dni

	Dziecko przebywało w szpitalu	Dziecko nie przebywało w szpitalu
średnia	9,23 dni	6,95 dni
mediana	7 dni	6 dni
Min	3 dni	2 dni
max	27 dni	14 dni

Podstawa: matki, które zadeklarowały wystąpienie choroby spowodowanej zakażeniem rotawirusem któregośkolwiek ze swoich dzieci

Na podstawie informacji udzielonych przez matki, można zauważyć, że średnio 9–11% dzieci w wieku 6 tygodni – 5 lat było w szpitalu z powodu zakażenia rotawirusem. Najczęściej okres hospitalizacji to 5 dni, w dalszej kolejności 3 i 7 dni. **94% dzieci przebywa w szpitalu 3 dni lub dłużej**

POBYT W SZPITALU I JEGO DŁUGOŚĆ


Czy z powodu zakażenia rotawirusowego dziecko przebywało w szpitalu? Ile dni?

W przeliczeniu jest to ok.

9%-11%

badanych dzieci w wieku 6tyg – 5 lat, które z powodu choroby rotawirusowej były hospitalizowane

Średnio: 5,23 dni
Mediana: 5 dni



ZWOLNIENIE LEKARSKIE

Czy któreś z rodziców przebywało na zwolnieniu lekarskim wynikającym z konieczności opieki nad dzieckiem w trakcie przechodzenia zakażenia rotawirusem? Jak długo trwało to zwolnienie?

W przeliczaniu na liczbę dzieci, w wieku 6 tyg-5 lat, których przynajmniej jedno z rodziców brało zwolnienie lekarskie z powodu choroby rotawirusowej [wynik dla obojga rodziców].



Średnio: 8,59 dni
Mediana: 7 dni
Min: 2 dzień
Max: 27 dni

średnia
mediana
Min
max

Dziecko przebywało w szpitalu

9,23 dni
7 dni
3 dni
27 dni

Dziecko nie przebywało w szpitalu


6,95 dni
6 dni
2 dni
14 dni

Podstawa: dzieci matek, które zadeklarowały wystąpienie choroby spowodowanej zakażeniem rotawirusem któregośkolwiek ze swoich dzieci

Ponad połowa rodziców zaraża się od swoich dzieci chorobą wywołaną rotawirusem. W związku z chorobą zarówno matki, jak i ojcowie przebywali na zwolnieniu lekarskim.

ZARAŻENIE SIĘ RODZICÓW OD CHOREGO DZIECKA

Czy Pani lub ojciec dziecka zarażyło się od dziecka chorobą rotawirusową?



ZWOLNIENIE LEKARSKIE Z POWODU CHOROBY RODZICA

Czy przebywała Pani albo ojciec dziecka na zwolnieniu lekarskim z powodu Pana/Pani choroby rotawirusowej? Jak długo trwało to zwolnienie lekarskie?

TAK, tylko ja byłam na zwolnieniu lekarskim

26%

TAK, tylko ojciec dziecka był na takim zwolnieniu

24%

TAK, zarówno ja, jak i ojciec dziecka byliśmy na takim zwolnieniu

18%

NIE

32%




Średnio: 5,62 dni
Mediana: 5 dni
Min.: 1 dzień
Max: 14 dni



Średnio: 5,59 dni
Mediana: 5 dni
Min.: 2 dni
Max: 14 dni

Podstawa: matki, które zadeklarowały wystąpienie choroby spowodowanej zakażeniem rotawirusem któregośkolwiek ze swoich dzieci

Matki mają bardzo wysoką znajomość szczepień dla dzieci. Nieco inaczej już kształtuje się poziom wiedzy o tym, które szczepienia są bezpłatne dla rodziców. W przypadku szczepień przeciwko rotawirusom: **90% matek zna**, 67% wie, że są płatne dla rodziców i 85% wie, że są szczepieniami zalecanymi.




ZNAJOMOŚĆ SZCZEPIEŃ

Proszę z poniższej listy szczepień dzieci wybrać te, o których Pani kiedykolwiek słyszała. [możliwość wielu odpowiedzi z kafeterii]. A które z tych szczepionek są według Pani płatne, rodzice muszą za nie płacić sami? A czy Pani zdaniem szczepienia przeciw rotawirusom są:

Matki wiedzące, że szczepienia przeciw rotawirusom są zalecane – szczepienia dodatkowe, uzupełniające szerszą ochronę dziecka

Świadomość odpłatności za szczepienia [spośród znanych szczepień]




Połowa mam zaszczepiła któreś ze swoich dzieci przeciw rotawirusom. Z kolei 33% matek, które tego nie zrobiły nie planuje dokonać takiego szczepienia.

SZCZEPIENIE PRZECIWKO ROTAWIRUSOM

Czy zaszczepiła Pani swoje dziecko / dzieci przeciw rotawirusom?



A czy planuje Pani zaszczepić swoje dziecko / dzieci?




W przeliczeniu ok. **29%** badanych dzieci zostało zaszczepionych przeciw rotawirusom

Główną motywacją do zaszczepienia przeciw rotawirusom jest obawa przed zachorowaniem, ale również chęć wykonania wszystkich szczepień w trosce o zdrowie dziecka.

MOTYWATORY

Dlaczego zaszczepiła lub planuje Pani zaszczepić dziecko / dzieci przeciw rotawirusom? [więcej niż 1 wskazanie, kafeteria odpowiedzi]




N=318

Główną barierą przed zaszczepieniem dziecka przeciwko rotawirusom jest koszt szczepienia. W drugiej kolejności – obawa przed nadmiernym obciążeniem układu odpornościowego dziecka oraz powikłaniami w postaci poważnych chorób, takich jak: autyzm, paraliż czy drgawki.

BARIERY

Dlaczego NIE zaszczepiła i NIE planuje Pani zaszczepić dziecko / dzieci przeciw rotawirusom? [więcej niż 1 wskazanie, kafeteria odpowiedzi]

NIE STAĆ MNIE NA TO SZCZEPIENIE, BO JEST ZA DROGIE 28%




N=87

Źródła informacji o szczepieniach

Lekarz pediatra, a następnie **lekarz rodzinny** są kluczowymi źródłami informacji o szczepieniach dzieci.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O SZCZEPIANIACH

Gdzie poszukiwała Pani informacji o szczepieniach dzieci? [możliwość wielu odpowiedzi]



Jakikolwiek pediatra:

68%



Jakakolwiek położna / pielęgniarka:

49%



Internet:


49%



Większość matek rozmawiała z lekarzem rodzinnym / pediatrą o szczepieniach przeciw rotawirusom, w większości **lekarze zachęcili je do tego szczepienia**. O istotnej jego roli świadczy fakt, że matki, które zaszczepiły którekolwiek swoje dziecko częściej rozmawiały z lekarzem i częściej były zachęcane niż matki, które takiego szczepienia nie wykonały.

ROLA LEKARZA W ROZMOWACH O SZCZEPIENIACH NA ROTAWIRUSY

Czy rozmawiała Pani z lekarzem pediatrą / lekarzem rodzinnym na temat szczepienia na rotawirusy?




90%

matek, które zaszczepiły którekolwiek swoje dziecko przeciw rotawirusom, rozmawiało z lekarzem o szczepieniu, vs **57%** matek, które nie zaszczepiły

Jak ocenia Pani Postawę lekarza wobec zaszczepienia dziecka przeciw rotawirusom?

lekarz **NIE ZACHĘCIŁ** mnie do tego szczepienia



95%

matek, które zaszczepiły którekolwiek swoje dziecko przeciw rotawirusom, było zachęconych przez lekarza vs **64%** matek, które nie zaszczepiły

Dla **64%** matek, lekarz pediatra przy wyborze szczepienia dla dziecka;


Dla **59%** pediatra jest największym autorytetem w tym zakresie.

Opinie o włączeniu szczepienia przeciw rotawirusom do bezpłatnych dla rodziców szczepień obowiązkowych

70% mam uważa, że **szczepienia przeciw rotawirusom** powinny być włączone do Programu Szczepień Obowiązkowych. Niemal połowa, bo **44%** z mam uważa, że szczepienia przeciw rotawirusom powinny być włączone **w pierwszej kolejności**.

POSZERZENIE ZAKRESU SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH O SZCZEPIENIA ZALECANE

Które szczepienia z obecnie zalecanych, powinny być Pani zdaniem włączone do Programu Szczepień Obowiązkowych, czyli szczepień bezpłatnych dla rodziców? [więcej niż 1 wskazanie]



N=500

Proszę teraz uszeregować te szczepienia w kolejności od tego, które Pani zdaniem powinny zostać w pierwszej kolejności włączone do Programu Szczepień Obowiązkowych. [rangowanie wybranych]




N=468

Ranking budowany w oparciu o sumę punktów przydzielanych zgodnie z zasadą: za każde pierwsze miejsce 7 pkt, drugie 6 pkt aż do 7 miejsca, gdzie przyznawany jest 1 pkt.

Zdecydowana większość, bo 3 na 4 matki, deklaruje, że zaszczepiłyby swoje dziecko przeciw rotawirusom, gdyby były one bezpłatne dla rodziców, wpisane na listę szczepień obowiązkowych. **66%** matek, które nie zaszczepiły swojego dziecka przeciw rotawirusom, zdecydowałyby się na to szczepienie, gdyby było ono bezpłatne dla rodziców, wpisane na listę szczepień obowiązkowych.

SKŁONNOŚĆ DO ZASZCZEPIENIA

Proszę określić na ile skłonna byłaby Pani zaszczepić swoje dziecko przeciw rotawirusom, gdyby szczepionka była bezpłatna, wpisana na listę szczepień obowiązkowych? Gdyby dzisiaj miałyby Pani podjąć decyzję o szczepieniu, to na ile byłaby Pani skłonna zaszczepić swoje dziecko przeciw rotawirusom, gdyby byłyby one bezpłatne, wpisane na listę szczepień obowiązkowych?



66% mam, które **NIE zaszczepiły** dotychczas dziecka, zdecydowałyby się na **szczepienie bezpłatne dla rodziców**

VS

87% które **już zaszczepiły** dziecko zdecydowałyby się na **to ponownie**

77% matek zgadza się ze stwierdzeniem:

„Szczepienia przeciw rotawirusom powinny być zaliczane do szczepień obowiązkowych, dzięki czemu byłyby one dostępne bezpłatnie dla rodziców”

Podsumowując...



97% matek jest świadomych chorób spowodowanych zakażeniem rotawirusem, a **52%** matek się ich obawia



77% matek dzieci, które przebyły chorobę spowodowaną rotawirusem, uznaje ją za uciążliwą dla dziecka i domowników



91% matek zna szczepienia przeciw rotawirusom. Matki, które nie zaszczepiły żadnego swojego dziecka i nie planują zaszczepić przeciw rotawirusom, decyzję motywują głównie **wysokim kosztem szczepienia**



70% matek uważa, że szczepienia przeciw rotawirusom **powinny być włączone** do Programu Szczepień Obowiązkowych dzięki czemu byłyby bezpłatne dla rodziców. **44%** matek uważa, że powinny być włączone w pierwszej kolejności spośród innych szczepień.

KANTAR

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Magda Rumas

@magdalena.rumas@kantat.com

M +48 698 631 366

Kantar Polska S.A. | pl. Konesera 9, 03-763 Warszawa

MSD Polska Sp. z o.o.*ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa tel. (22) 549 51 00, fax (22) 549 51 01
www.msd.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,
KRS nr 0000180490, NIP 9512098811, Kapitał Zakładowy 6 060 000 PLN *Filia Merck & Co., Inc., Whitehouse
Station N.J., U.S.A.®Zastrzeżona nazwa handlowa Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.,
©Zastrzeżone prawa autorskie MSD Polska Sp. z o.o

06.2020 PL-ROT-00009 wyd 06.2020

Niniejsze badanie zostało sfinansowane przez MSD Polska sp. z o.o.